



KARASİNEK MÜCADELESİ

Kullanım Amacı

Çiftlik içinde hayvanların yaşam alanlarındaki erişkin kara sineklerin kontrolünde kullanılır.

Uygulama Şekli

Sprey ya da boyama yöntemi ile uygulanır. Boyama yönteminde levhalar kullanılabilir. Bu sayede ölen sineklerin etrafa yayılması engellenmiş olur.

Aktif Madde İçeriği

Acetamidrid 10%

Çekici Madde İçeriği

Z9 (erkek sinekler için)

Doğal feromonlar (dişi - erkek sinekler için)

Özellikleri

| GÖRÜNÜŞ | RENK | KALICILIK | UYGULAMA ŞEKLİ | | AMBALAJ | RAF ÖMRÜ |
|-----------------|-------|----------------------------|----------------|-------|---------|----------|
| Çözünebilir Toz | Beyaz | 6 ila 8 hafta boyama yönt. | Boyama | Sprey | 600 g | 24 ay |

Kullanım Alanları

Daha çok solüsyonun emiliminin güç olduğu yerler uygulama alanı olarak tercih edilmelidir. Bu işlem için Card Board uygulama levhalarını kullanmanızı öneririz. Bu levhalar uygulama solüsyonunun kurumadan etkinliğini muhafaza etmesine yardımcı olacak maddeden yapılmış olup, şekli itibari ile ölen sineklerin etrafa yayılmasını ve etrafın kirlenmesini engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Şayet Card Board levhalar kullanılmıyacaksa amacına uygun bir etkinlik yakalayabilmek için güneş alan yerler, buzağı kulübelerin üzerleri buzağılıkları çevreleyen demir parmaklıklar, sağımhane içi, soğutma tankı odasında muhtelif yerlerin üzerlerine uygulayınız.

Etki Şekli

Sinir uçlarındaki kolinesteraz enzimini etkisiz hale getirerek gücünü gösterir. Bu enziminin görevi, sinir iletiminde rol oynayan asetilkolinin fazlasını ortamdaki uzaklaştırmasıdır. Bu hali ile sinirsel uyarımlar son bulur. Ancak kolinesteraz enzimi etkisiz hale gelince ortamdaki asetilkolin fazlalığı uzaklaştırılmaz ve oluşan sinirsel uyarımlar hiç bir zaman son bulamaz ve sineklerde felç ile sonuçlanan ölüm gerçekleşir.

Konsantrasyon ve Uygulama Şartları

| UYGULAMA ŞEKLİ | HASTALIK HALLERİNDE |
|----------------|--|
| Boyama | 100 ml ürün + 80 ml su = 40 m ² alan için yeterli |
| Sprey | 100 g ürün + 800 ml su = 20 m ² alan için yeterli |

Spreyleme yapılacaksa 800 ml su dolu kovanın içerisine 100 g ürün katılarak iyice karıştırılır. Solüsyon sırt pompası ile çiftlik içinde yukarıda tarif edilen alanlara spreyleyerek uygulanır. Card Bord yada yüzey boyama şeklinde uygulanacaksa; 100 g ürün 80 ml su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir. Ürünün çekiciliğini arttırmak için su yerine cola kullanımı daha etkili sonuçların alınmasına katkıda bulunur. Hazırlanan bulamaç solüsyon bir fırça yardımı ile Card Board'lara ya da çiftlik içindeki alanlarda yukarıda tarif edilen yerlere şeritler halinde uygulanır. Boyama şeklindeki uygulamalarda 5'er cm² lik alanlar, spreylemede ise 20'şer cm² lik alanlar uygulama alanı olarak seçilmelidir. Böylece sineklerin konmayı tercih edecekleri kuru yüzeyleri oluşturabilirsiniz. Boyama yönteminde 6 ila 8 hafta etkilidir.